

Link do produktu: <https://esilver.com.pl/plyn-do-dezynfekcji-i-odkazania-rak-500-ml-p-742.html>



## Płyn do dezynfekcji i odkażania rąk 500 ml

Cena brutto	<b>35,64 zł</b>
Cena netto	<b>33,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>1-2 dni robocze</b>
Kod produktu	<b>ML542</b>
Kod EAN	<b>5907626633542</b>

### Opis produktu

## Medi-Line Velodes Soft 0.5L płyn do odkażania i dezynfekcji rąk

Gotowy do użycia o przedłużonym działaniu, preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji rąk. Łagodny dla skóry, nie posiada barwników i substancji zapachowych, dzięki czemu nie powoduje podrażnień. Działa szybko i skutecznie wobec wirusów otoczkowych (w tym HIV, HBV, HCV) oraz wirusa Rota i Noro. Preparat zawiera lanolinę - zmiękczającą substancję ochronną, która zabezpiecza głębsze warstwy naskórka.

- opakowanie: 0,5 l (butelka)
- przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
- zastosowanie: szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie, domy opieki społecznej; polecany do stosowania przez lekarzy, pielęgniarki, pacjentów
- bardzo szybkie działanie na wirusy otoczkowe
- szerokie spektrum bakteriobójcze, bójcze wobec prątków drożdży, gruźlicy i wirusów (ograniczone)
- czas działania: 30 sekund
- produkt przebadany dermatologicznie
- produkt zawiera w składzie alkohol
- przeznaczony do profesjonalnego stosowania
- posiada pozwolenie na obrót produktem biobójczym

Spektrum	Normy wg EN 14885	Doza i czas
<b>Bakterie</b> (w tym MRSA)	EN 13727	30 sek.
<b>Grzyby</b> ( <i>C. albicans</i> )	EN 1275	30 sek.
<b>Prątki gruźlicy</b> ( <i>M. terrae</i> )	EN 14348	30 sek.
<b>Wirusy osłonkowe</b> (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, wirus grypy, Herpes simplex)	EN 14476	30 sek.
<b>Wirus Rota</b>	EN 14476	45 sek.

### Sposób użycia:

Higieniczna dezynfekcja rąk (wg EN 1500): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w dłonie przez 2 x 15 sekund. Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791): 2 x 1,5 ml preparatu wcierać w czyste, suche dłonie przez 90 sekund. Przez cały czas utrzymywać ręce w stałej wilgotności poprzez uzupełnianie preparatu. Preparat wykazuje przedłużone działanie dezynfekcji chirurgicznej w czasie 3 godz. Przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

**Skład:**

**Substancja czynna w 100 g produktu:** 60 g propan-2-ol, 0,5 g glukonian chlorheksydyny

**Uwaga:**

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.



[Zobacz wszystkie środki do dezynfekcji rąk](#)