Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 07:16

Link do produktu: https://esilver.com.pl/plyn-do-dezynfekcji-rak-z-pompka-500-ml-medisept-velodes-soft-p-1207.html



Płyn do dezynfekcji rąk z pompką 500 ml Medisept Velodes® Soft

Cena brutto	**28,92 zł**
Cena netto	**26,78 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**2-4 dni robocze**
Kod produktu	**P0_K348**
Kod EAN	**5907626633542**

Opis produktu

Velodes Soft płyn do dezynfekcji rąk 500 ml z pompką

Gotowy do użycia o przedłużonym działaniu, preparat na bazie alkoholu do szybkiej dezynfekcji rąk. Łagodny dla skóry, nie posiada barwników i substancji zapachowych, dzięki czemu nie powoduje podrażnień. Działa szybko i skutecznie wobec wirusów otoczkowych (w tym HIV, HBV, HCV) oraz wirusa Rota i Noro. Preparat zawiera lanolinę - zmiękczającą substancję ochronną, która zabezpiecza głębsze warstwy naskórka.

- opakowanie: 0,5 l (butelka + pompka dozująca)
- przeznaczony do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk
- zastosowanie: szpitale, przychodnie, gabinety lekarskie, domy opieki społecznej; polecany do stosowania przez lekarzy, pielęgniarki, pacjentów
- bardzo szybkie działanie na wirusy otoczkowe
- szerokie spektrum bakteriobójcze, bójcze wobec prątków drożdży, gruźlicy i wirusów (ograniczone)
- czas działania: 30 sekund
- produkt przebadany dermatologicznie
- pozwolenie na obrót produktem biobójczym nr: 6174/15
- produkt zawiera w składzie alkohol
- przeznaczony do profesjonalnego stosowania

Spektrum	Normy wg EN 14885	Doza i czas
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	30 sek.
Grzyby (C. albicans)	EN 1275	30 sek.
Prątki gruźlicy (M. terrae)	EN 14348	30 sek.
Wirusy osłonkowe (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola, wirus grypy, Herpes simplex)	EN 14476	30 sek.
Wirus Rota	EN 14476	45 sek.

Sposób użycia:

- Chirurgiczna dezynfekcja rąk (wg EN 12791) dwie dozy płynu wetrzeć w suche, umyte dłonie przez 2 x 45 sekund. Utrzymywać dłonie w stałej wilgotności przez uzupełnianie środka. Płyn ma przedłużone działanie dezynfekcyjne do 3 godzin.
- Higieniczna dezynfekcja (wg EN 1500)- 2 dozy preparatu (3 ml) wetrzeć w ręce 2 x 15 sekund. Nie stosować bezpośrednio na otwarte rany i śluzówkę

Skuteczność mikrobiologiczna:

Bakterie (włącznie z Tbc*, MRSA) grzyby i wirusy (włącznie z HBV, HCV, HIV, SARS, Vaccinia, H5N1, A/H/1N1).



Zobacz wszystkie środki do dezynfekcji rąk