Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:36

Link do produktu: https://esilver.com.pl/enzymatyczny-koncentrat-do-dezynfekcji-i-mycia-narzedzi-viruton-extra-1l-p-727.html



Enzymatyczny koncentrat do dezynfekcji i mycia narzędzi Viruton Extra 1L

Cena brutto	**111,33 zł**
Cena netto	**103,08 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**1-2 dni robocze**
Kod produktu	**ML382**

Opis produktu

Wydajny koncentrat do dezynfekcji i mycia narzędzi, instrumentów VIRUTON EXTRA 1L

Viruton® Extra to wydajny, enzymatyczny koncentrat przeznaczony do jednoczesnego mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych i rotacyjnych. Zawiera enzym proteazę, dzięki czemu wykazuje bardzo dobre właściwości czyszczące. Skutecznie usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne. Przeznaczony jest do manualnej dezynfekcji narzędzi oraz dezynfekcji w myjkach ultradźwiękowych. Produkt wykazuje właściwości antykorozyjne (zawiera inhibitor korozji) i wysoką tolerancję materiałową. Jest zalecany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, gumy, porcelany, szkła i tworzywa sztucznego. Dzięki innowacyjnej formule opartej na synergii surfaktanów i technologii nano-miceli produkt posiada szerokie spektrum bójcze i wyjątkowe właściwości myjące.

Główne cechy produktu:

- przebadany zgodnie z nowymi normami dla środków dezynfekujących (EN 14885)
- szerokie spektrum mikrobójcze (patrz niżej)
- wyjątkowe właściwości myjące
- wysoka tolerancja materiałowa
- nie zawiera aldehydów
- możliwość zastosowania do wielu wrażliwych materiałów
- ekonomiczny w użyciu

Spektrum	Normy wg EN 14885	Czas	
		15 min.	30 min.
Bakterie (w tym MRSA)	EN 13727	0,5%	
	EN 14561	1%	0,5%
Grzyby (C. albicans)	EN 13624	0,5%	
	EN 14562	1%	0,5%
Prątki gruźlicy (M. avium, M. terrae)	EN 14348	0,5%, 1%	0,5%
	EN 14563	1%*, 2%	0,5%
Wirusy otoczkowe (w tym HBV, HCV, HIV, Vaccinia,	EN 14476	0,5%	

BVDV)			
Wirus Adeno	EN 14476	0,5%*	0,5%
Wirus Polio	EN 14476	1%	0,5%*

SPOSÓB UŻYCIA
Przygotować roztwór użytkowy koncentratu poprzez rozcieńczenie z wodą w odpowiedniej proporcji. Wybór stężenia zależy od pożądanego spektrum i czasu działania. W celu otrzymania stężenia 0,5% należy 5 ml koncentratu rozpuścić w 995 ml wody. Instrumenty bezpośrednio po użyciu zanurzyć w roztworze. Wszystkie części i otwory muszą być całkowicie wypełnione roztworem. Po dezynfekcji, instrument wypłukać i wysuszyć. Aktywność nieskażonego roztworu roboczego wynosi 14 dni. Ze względów higienicznych zaleca się codzienną wymianę roztworu. Nie łączyć z innymi środkami czyszczącymi lub dezynfekującymi.

OPAKOWANIE
butelka 1 litr z dozownikiem (dostępny również w kanistrze 5L)

SKŁAD
100 g zawiera:
11,5 g N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano-1,3–diamina (CAS: 2372-82-9)
3,12 g Poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól) (CAS: 94667-33-1)
1,25 g Chlorek didecylodimetyloamonu (CAS: 7173-51-5)